癌化学療法 投与計画書 （新規・変更）

病名： KRAS遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の 結腸癌 ・ 直腸癌

プロトコール名:**ベクティビックス+イリノテカン療法**

クール目

開始日

次回予定日

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(㎡)
		.

※0.22マイクロ以下のフィルターを通して投与

	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	ｺﾒﾝﾄ	DAY 1 1月 0日	DAY 2 1月 1日	DAY 3 1月 2日	DAY 4 1月 3日
1	イメンドカプセル125mg		1カプセル	経口			○			
	イメンドカプセル80mg		1カプセル	経口				○	○	
2	アロキシ点滴静注バッグ(0.75mg)		1バッグ	点滴	15分		○			
	デキサート(6.6mg)		0.5瓶	点滴			○			
3	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○			
4	生理食塩液		100mL	点滴	60分(投与量が1000mgを超える場合は90分)		○			
	ベクティビックス	6mg/Kg		点滴			○			
5	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○			
6	生理食塩液		500mL	点滴	90分		○			
	イリノテカン	150mg/㎡		点滴			○			
7	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○			
8	ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠(0.5mg)		8錠 分2	経口		day1, 15夜～ day4, 18朝	○(夜～	○	○	～朝)○

標準投与量

ベクティビックス

mg

イリノテカン

mg

※網掛け部分にご記入ください。

1サイクル:14日
投与日： ベクティビックス day1
イリノテカン day1