# 癌化学療法 投与計画書　（新規・変更）

病名：　（結腸癌）・　直腸癌

プロトコール名：**アバスチン+XELOX療法**

| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(㎡) |
|---|---|---|
| | | 0.000 |

クール目

開始日

次回予定日

**◆オキサリプラチンによる末梢神経障害対策として、前投薬中にカルチコール2A ,マグネシウム硫酸補正液8mLを追加することができる。**

| | 薬品名 | プロトコール標準量 | 投与量 | 経路 | 点滴時間・速度 | ｺﾒﾝﾄ | DAY 1<br>1月 0日 | DAY 2<br>1月 1日 | DAY 3<br>1月 2日 | DAY 4<br>1月 3日 | … | DAY 14<br>1月 13日 | 標準投与量<br>ゼローダ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼローダ | 2000mg/m$^2$/day<br>★下記参照 | | 経口 | | 1日2回<br>朝夕食後<br>30分以内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2400mg |
| 2 | イメンドカプセル125mg | | 1カプセル | 経口 | | | ○ | | | | | | |
| | イメンドカプセル80mg | | 1カプセル | 経口 | | | | ○ | ○ | | | | |
| 3 | アロキシ点滴静注バッグ(0.75mg) | | 1バッグ | 点滴 | 30分 | | ○ | | | | | | |
| | デキサート(6.6mg) | | 0.5瓶 | 点滴 | | | ○ | | | | | | |
| 4 | 生理食塩液 | | 50mL | 点滴 | 15分 | | ○ | | | | | | |
| 5 | 生理食塩液 | | 100mL | 点滴 | 初回は90分→60分→30分 | | ○ | | | | | | アバスチン |
| | **アバスチン** | 7.5mg/kg | | 点滴 | | | ○ | | | | | | mg |
| 6 | 生理食塩液 | | 50mL | 点滴 | 15分 | | ○ | | | | | | |
| 7 | 5%ブドウ糖注 | | 250mL | 点滴 | 120分 | | ○ | | | | | | オキサリプラチン |
| | **オキサリプラチン** | 130mg/㎡ | | 点滴 | | | ○ | | | | | | mg |
| 8 | 生理食塩液 | | 50mL | 点滴 | 15分 | | ○ | | | | | | |
| 9 | デカドロン錠(0.5mg) | | 8錠　分2 | 経口 | | day1夜～day4朝 | ○(夜～ | ○ | ○ | ～朝)○ | | | |

**1サイクル：　21日**
**投与日：　ゼローダ　day1-14**
**アバスチン、オキサリプラチン　day1**

オキサリプラチン
総投与量チェック　mg

アバスチンの留意事項
禁忌
・喀血がある
避ける方が望ましい
・　大きな手術の28日以内である
・　血栓塞栓症の合併がある
・　蛋白尿2＋以上
・　消化管穿孔・瘻孔の合併がある

★ゼローダ1回用量

| 体表面積 | |
|---|---|
| 1.36m$^2$未満 | 1200mg |
| 1.36m$^2$以上1.66m$^2$未満 | 1500mg |
| 1.66m$^2$以上1.96m$^2$未満 | 1800mg |
| 1.96m$^2$以上 | 2100mg |