癌化学療法 投与計画書　（新規・変更）

病名：　結腸癌　・　直腸癌

プロトコール名：**アバスチン＋ロンサーフ療法**

クール目

開始日

次回予定日

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(㎡)
		0.000

	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY 1	…	DAY 6	DAY 7	DAY 8	…	DAY 13	…	DAY 15	標準投与量
							1月 0日	…	1月 5日	1月 6日	1月 7日	…	1月 12日	…	1月 14日	ロンサーフ
1	**ロンサーフ**	トリフルリジンとして 35mg/m²/回 ★下記参照		経口		**1日2回 朝夕食後**	○(夕～)	○	○(～朝)		○(夕～)	○	○(～朝)			***70mg***
2	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○								○	
3	生理食塩液		100mL	点滴	初回は 90分→ 60分→ 30分		○								○	アバスチン
	アバスチン	5mg/kg		点滴			○								○	***mg***
4	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○								○	

1サイクル：　28日
投与日：　ロンサーフ　day1夕-6朝, day8夕-13朝
アバスチン　day1, 15

アバスチンの留意事項
禁忌
・喀血がある
避ける方が望ましい
・ 大きな手術の28日以内である
・ 血栓塞栓症の合併がある
・ 蛋白尿2＋以上
・ 消化管穿孔・瘻孔の合併がある

★ロンサーフ1回用量

体表面積		
	1.07m²未満	35mg
	1.07m²以上1.23m²未満	40mg
	123m²以上1.38m²未満	45mg
	1.38m²以上1.53未満	50mg
	1.53m²以上1.69未満	55mg
	1.69m²以上1.84未満	60mg
	1.84m²以上1.99未満	65mg
	1.99m²以上2.15未満	70mg
	2.15m²以上	75mg