癌化学療法 投与計画書 （新規・変更）

病名： 結腸癌 ・ 直腸癌

プロトコール名：**アバスチン+ゼローダ療法**

クール目

開始日

次回予定日

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(㎡)
		0.000

	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	ｺﾒﾝﾄ	DAY 1 1月 0日	DAY 2 1月 1日	DAY 3 1月 2日	DAY 4 1月 3日	…	DAY 14 1月 13日	標準投与量 ゼローダ
1	**ゼローダ**	2000mg/m^2/day ★下記参照		経口		**1日2回 朝夕食後 30分以内**	○	○	○	○	○	○	***2400mg***
2	生理食塩液		50mL				○						
3	生理食塩液		100mL	点滴	初回は 90分→ 60分→ 30分		○						アバスチン
	アバスチン	7.5mg/kg		点滴			○						***mg***
4	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○						

1サイクル： 21日
投与日： ゼローダ day1-14
アバスチン day1

アバスチンの留意事項
禁忌
・ 喀血がある
避ける方が望ましい
・ 大きな手術の28日以内である
・ 血栓塞栓症の合併がある
・ 蛋白尿2＋以上
・ 消化管穿孔・瘻孔の合併がある

★ゼローダ1回用量

体表面積	
1.36m^{2}未満	1200mg
1.36m^{2}以上1.66m^{2}未満	1500mg
1.66m^{2}以上1.96m^{2}未満	1800mg
1.96m^{2}以上	2100mg