癌化学療法 投与計画書　(新規・変更)

病名：　(結腸癌)　・　直腸癌

プロトコール名：**アバスチン+XELIRI療法**

クール目

開始日

次回予定日

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(㎡)
		0.000

★UGT1A1遺伝子多型の*6ホモ接合体、*28ホモ接合体、*6/*28ダブルヘテロ接合体ではイリノテカン150mg/m2とする

	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY 1 1月 0日	DAY 2 1月 1日	DAY 3 1月 2日	DAY 4 1月 3日	…	DAY 14 1月 13日	標準投与量 ゼローダ
1	ゼローダ	800mg/m^2/回 ★下記参照		経口		1日2回 朝夕食後 30分以内	○	○	○	○	○	○	*1800mg*
2	イメンドカプセル125mg		1カプセル	経口			○						
	イメンドカプセル80mg		1カプセル	経口				○	○				
3	アロキシ点滴静注バッグ(0.75mg)		1バッグ	点滴	30分		○						
	デキサート(6.6mg)		0.5瓶	点滴			○						
4	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○						
5	生理食塩液		100mL	点滴	初回は 90分→ 60分→ 30分		○						アバスチン
	アバスチン	7.5mg/kg		点滴			○						*mg*
6	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○						
7	5%ブドウ糖注		500mL	点滴	90分 以上		○						イリノテカン
	イリノテカン	200mg/㎡		点滴			○						*mg*
8	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○						
9	デカドロン錠(0.5mg)		8錠　分2	経口		day1夜～day4朝	○(夜～	○	○	～朝)○			

1サイクル：21日
投与日：ゼローダ　day1-14
アバスチン、イリノテカン　day1

アバスチンの留意事項
禁忌
・喀血がある
避ける方が望ましい
・大きな手術の28日以内である
・血栓塞栓症の合併がある
・蛋白尿2＋以上
・消化管穿孔・瘻孔の合併がある

★ゼローダ1回用量

体表面積	
1.31m^{2}未満	900mg
1.31m^{2}以上1.69m^{2}未満	1200mg
1.69m^{2}以上2.07m2未満	1500mg
2.07m^{2}以上	1800mg