

処方名

▶ クラス III

アセモトール

処方

ミョウバン(硫酸アルミニウムカリウム)	100 g
サリチル酸	50 g
酸化亜鉛	700 g
タルク	700 g
グリセリン	400 mL
局方エタノール	1000 mL
ハッカ油	0.5 mL
加水全量		10 L (100本分)

調製法

- ①専用ポリタンクをよく洗浄し、精製水を適量注いだ後ミョウバンを溶かす。
- ②500mLメートルグラスでグリセリンを量り、タンクへ加える。
- ③1Lメートルグラスに局方エタノールを入れ、そこへサリチル酸を溶解する。
- ④③の溶液をタンクに加える。
- ⑤下に新聞紙を敷き、タンクとホモキサーをセットする。
- ⑥攪拌しながら酸化亜鉛、タルクを分割して加える。
- ⑦程よく攪拌できたらハッカ油を加える。
- ⑧精製水を加え、全量を10Lとする。
- ⑨攪拌しながら、漏斗を使用して100mL透明プラボトルへ分注する。
- ⑩全て分注し終わったら少し静置して、沈殿物の量がだいたい均等か見る。
- ⑪外用薬のシールを貼り保管する。

容器・貯法

透明プラボトル / 室温

備考(廃棄等)

・分注時:適宜攪拌する

