

癌化学療法 投与計画書

病名: 悪性リンパ腫

プロトコール名: **R-CHOP療法**

身長(cm) 体重(kg) 体表面積(m²)

クール目 クール目

開始日

次回予定日

- ・心機能低下症例ではドキソルピシンからピノルピン(30-40mg/m² @ 5%ブドウ糖注100mL)に変更可。
- ・便秘、末梢神経障害が強い症例ではオンコピンをフィルデシン(2.4mg/m²@ 生食50mL)に変更可。

	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY	DAY	...	DAY	
							1	2	6		
							1月0日	1月1日		1月5日	
1	生理食塩液		100mL	点滴	30分		○	/		/	標準投与量
	アタラックスP(50mg)		1A	点滴			○	/		/	
	ハイドロコートン(100mg)		1瓶	点滴			○	/		/	
2	生理食塩液		500mL	点滴			○	/		/	標準投与量
	リツキシマブBS	375mg/m ²		点滴	最初1時間は100ml/h、その後は200ml/h		○	/		/	mg
3	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○	/		/	
4	生理食塩液		100mL	点滴	15分		/	○		/	
5	ソルデム3輸液		500mL	側管	3時間		/	○		/	
	メイロン(20ml)		2A	側管			/	○		/	
6	グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg)		1バッグ	側管	30分		/	○		/	
7	生理食塩液		50mL	側管	全開で		/	○		/	オンコピン
	オンコピン	1.4mg/m ²		側管		2mg/bodyを超えないこと	/	○		/	0.mg
8	生理食塩液		100mL	側管	30分		/	○		/	ドキソルピシン
	ドキソルピシン	50mg/m ²		側管			/	○		/	mg
9	生理食塩液		500mL	側管	3時間		/	○		/	エンドキサン
	エンドキサン	750mg/m ²		側管			/	○		/	mg
10	生理食塩液		50mL	側管	15分		/	○		/	
11	ブレドニン錠(5mg)	100mg	朝14錠、昼6錠	内服			/	○	...	○	

※網掛け部分にご記入ください。

1サイクル: 21日
 投与日: day1,day2
 クール数: 計6~8クール

ドキソルピシン
 総投与量超えないように

mg