

癌化学療法 投与計画書 (新規・変更)

病名: CD20陽性の濾胞性リンパ腫

プロトコール名: **ガザイバ+トレアキシシ療法(2サイクル目以降)**

	[]	クール目	身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m ²)
開始日	[]				
次回予定日	[]				

						DAY 1	DAY 2	DAY 3		
						1月0日	1月1日	1月2日		
1	カロナール錠(200mg)	3錠	内服		コメント ガザイバ投与 30分以上前に内服	○	/	/	標準投与量	
2	生理食塩液	100mL	点滴	30分		○	/	/		
	アタラックスP(50mg)	1A	点滴			○	/	/		
	ソル・メドロール(40mg)	2瓶	点滴			○	/	/		
3	生理食塩液	210mL	点滴	初回:12.5ml/h(30min)→ 25ml/h(30min)→以降30分毎 に12.5ml/hずつ増量。最大 100ml/hまで可	0.2又は0.22µmの フィルターを使用	○	/	/	ガザイバ 1000mg	
	ガザイバ	1000mg/body	点滴	2回目以降:25ml/h(30min)→ 50ml/h(30min)→以降30分毎 に25ml/hずつ増量。最大100 ml/hまで可		○	/	/		
4	生理食塩液	50mL	点滴	15分		○	/	/	トレアキシシ mg	
5	生理食塩液	100mL	点滴	15分		/	○	○		
6	グラニセロン点滴静注 バッグ(3mg)	1バック	側管	30分		/	○	○		
7	生理食塩液	250mL	側管	60分	全量が250mLにな るよう薬剤室で調節	/	○	○		
	注射用水	0mL	側管		100mgは1バイアル につき注射用水 40mLで溶解 25mgは1バイアル につき注射用水10 mLで溶解	/	○	○		
	トレアキシシ	90mg/m ²	側管			/	○	○		

※網掛け部分にご記入ください。

1サイクル: 28日
投与日: ガザイバ day1
トレアキシシ day2、3
サイクル数: 6サイクル
(ガザイバとトレアキシシ初日は同日でも可 →その際は確認事項に注意すること)