癌化学療法 投与計画書

病名:　　結腸癌　・　直腸癌

プロトコール名:**アバスチン＋ロンサーフ療法**

クール目

開始日

次回予定日

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(㎡)
		0.000

	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間･速度	コメント	DAY 1 1月 0日	…	DAY 6 1月 5日	DAY 7 1月 6日	DAY 8 1月 7日	…	DAY 13 1月 12日	…	DAY 15 1月 14日	標準投与量 ロンサーフ
1	**ロンサーフ**	トリフルリジンとして 35mg/m^2/回 ★下記参照		経口		**1日2回 朝夕食後**	○(夕～)	○	○(～朝)		○(夕～)	○	○(～朝)			*70mg*
2	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○								○	
3	生理食塩液		100mL	点滴	初回は 90分→ 60分→ 30分		○								○	アバスチン
	アバスチン	5mg/kg		点滴			○								○	*mg*
4	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○								○	

1サイクル:　28日
投与日:　ロンサーフ　day1夕-6朝, day8夕-13朝
アバスチン　day1, 15

アバスチンの留意事項
禁忌
・ 喀血がある
避ける方が望ましい
・ 大きな手術の28日以内である
・ 血栓塞栓症の合併がある
・ 蛋白尿2＋以上
・ 消化管穿孔･瘻孔の合併がある

★ロンサーフ1回用量

体表面積	1.07m^2未満	35mg
	1.07m^2以上1.23m^2未満	40mg
	123m^2以上1.38m^2未満	45mg
	1.38m^2以上1.53未満	50mg
	1.53m^2以上1.69未満	55mg
	1.69m^2以上1.84未満	60mg
	1.84m^2以上1.99未満	65mg
	1.99m^2以上2.15未満	70mg
	2.15m^2以上	75mg