

癌化学療法 投与計画書

病名: 再発又は難治性の多発性骨髄腫

プロトコール名: **E-Pd療法**

クール目
 開始日
 次回予定日

身長(cm) 体重(kg) 体表面積(m²)

※ 0.22マイクロ以下のフィルターを通して投与

薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間/速度	コメント	DAY 0	DAY 1	...	DAY 7	DAY 8	...	DAY 14	DAY 15	...	DAY 21	DAY 22		
1 ポマリスタカプセル(4mg)	4mg/body		経口			#####	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
2 カロナール錠(200mg)		2錠	経口		エムプリシティ投与30~90分前までに服用		○			(○)			(○)			(○)		
3 生理食塩液		100mL	点滴	30分			○			(○)			(○)			(○)		
デキサート(6.6mg)		1V	点滴				○			(○)			(○)			(○)		
ガスター(20mg)		1A	点滴				○			(○)			(○)			(○)		
4 生理食塩液		100mL	点滴	30分			○			(○)			(○)			(○)		
アトラックスP(30mg)		1A	点滴				○			(○)			(○)			(○)		
5 生理食塩液		50mL	点滴	15分			○			(○)			(○)			(○)		
6 生理食塩液	★下記参照	150~350mL	点滴				○			(○)			(○)			(○)		
注射用水		20mL					○			(○)			(○)			(○)		
エムプリシティ点滴静注用	1, 2サイクル目 10mg/kg				25mg/mLの速度で溶解 (300mg製剤は注射用水13mL, 400mg製剤は注射用水17mL) 3サイクル目以降はday6,15,22投与なし											○		
エムプリシティ点滴静注用	3サイクル目以降 20mg/kg																	○
7 生理食塩液		50mL	点滴	15分				○			(○)			(○)			(○)	
8 レナデックス錠(4mg)	28mg/body (75歳を超える場合は8mg)	28 mg	経口		投与の3~24時間前に内服 3サイクル目以降はday7,14,21投与なし		○			(○)			(○)			(○)		
9 レナデックス錠(4mg)	40mg/body (75歳を超える場合は20mg) (3サイクル目以降)	40 mg	経口		3サイクル目以降のみ					○			○			○		

標準投与量

ポマリスタ

4mg

エムプリシティ

1, 2サイクル目

.mg

3サイクル目以降

.mg

※網掛け部分にご記入ください。

★生理食塩液 希釈液量
 体重 50kg未満: 150mL
 50~90kg: 250mL
 90kg超: 350mL

1サイクル: 28日
投与日: エムプリシティ day1, 8, 15, 22 (3サイクル目以降はday1のみ)
ポマリスタ day1~21
レナデックス28mg: 1~2サイクル目 day0, 7, 14, 21
3サイクル目以降 day0
レナデックス40mg: 3サイクル目以降 day8, 15, 22