癌化学療法 投与計画書

病名： 結腸癌 ・ 直腸癌 ・ 胃癌

プロトコール名：**SOX療法**

クール目

開始日

次回予定日

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(㎡)
		0.000

◆オキサリプラチンによる末梢神経障害対策として、前投薬中にカルチコール2A ,マグネシウム硫酸補正液8mLを追加することができる。
◆プロイメンドによる血管トラブルがある場合はイメンドカプセルに変更できる(その際、プロイメンドのオーダー削除して下さい)重複投与注意！！

	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY 1 1月 0日	DAY 2 1月 1日	…	DAY 4 1月 3日	…	DAY 14 1月 13日	標準投与量 TS-1
1	TS-1	体表面積 1.25㎡未満：40mg×2 1.25～1.5㎡未満：50mg×2 1.5㎡以上：60mg×2		経口			○	○	○	○	○	○	80mg
2	生理食塩液		250mL	点滴	60分		○						
	プロイメンド(150mg)		1瓶	点滴			○						
3	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○						
4	アロキシ点滴静注バッグ (0.75mg)		1バッグ	点滴	30分		○						
	デキサート(6.6mg)		0.5瓶	点滴			○						
5	5%ブドウ糖注		250mL	点滴	120分		○						オキサリプラチン
	オキサリプラチン	130mg/㎡		点滴			○						mg
6	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○						
7	デカドロン錠(0.5mg)		8錠 分2	経口		day1夜～day4朝	○(夜～	○	○	～朝)○			

1サイクル： 21日
投与日： TS-1 day1-14
オキサリプラチン day1

オキサリプラチン
総投与量チェック

mg