

## 癌化学療法 投与計画書

病名: 非扁平上皮非小細胞肺癌

### プロトコール名: Pembro+CBDCA+PEM(導入療法)

	身長(cm)	体重(kg)	体表面積 (m <sup>2</sup> )
ケール目			
開始日			
次回予定日			

#### 確認事項

- 1週間以上前からハンピタ末 1g/分1を連日服用していること。
- 1週間以上前にフルスシSの筋注が施行されていること。(以降3コース毎に1回)

						DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4	
※0.2~5 μmのフィルターを通して投与						1月 0日	1月 1日	1月 2日	1月 3日	
薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント					
1 イメンドカプセル125mg		1カプセル	経口			○	/	/	/	標準投与量 キイトルーダ
イメンドカプセル80mg		1カプセル	経口			/	○	○		
2 生理食塩液		50mL	点滴	15分		○	/	/		
3 生理食塩液		100mL	点滴	30分		○	/	/	200mg	
<b>キイトルーダ</b>	200mg/body		点滴			○	/	/		
4 生理食塩液		50mL	点滴	5分		○	/	/		
5 アロキシ点滴静注バッグ (0.75mg)		1バッグ	点滴	15分		○	/	/	アリムタ	
デキササート(6.6mg)		0.75瓶	点滴			○	/	/		
6 生理食塩液		50mL	点滴	10分		○	/	/		
<b>アリムタ</b>	500mg/m <sup>2</sup>		点滴			○	/	/	mg	
7 5%ブドウ糖注		250mL	点滴	60分		○	/	/		
<b>カルボプラチン</b>	AUC=4-6		点滴			○	/	/		
8 生理食塩液		50mL	点滴	15分		○	/	/		
9 テカトロン錠(0.5mg)		8錠 分2	経口		day2~day4	/	○	○	○	

※網掛け部分にご記入ください。

1サイクル: 21日  
 投与日: day1  
 サイクル数: 原則として4コース