

## 癌化学療法 投与計画書

病名：乳癌

プロトコール名：ハーセプチン+パクリタキセル療法

クール目

開始日

次回予定日

身長(cm)  体重(kg)  体表面积(m<sup>2</sup>)

◆アルコール過敏症 有 無

DAY  
1

点滴：JMSニトログリセリン輸液セット、フィルター2型付き(JY-NF232R101)

薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	1月0日
1 レスタミンコーワ錠(10mg)		5錠	経口			○
2 生理食塩液		100mL	点滴	30分		○
デキサート(6.6mg)		1.5瓶	点滴			○
ガスター(20mg)		1A	点滴			○
3 生理食塩液		250mL	点滴	60分		○
<b>パクリタキセル</b>	80mg/m <sup>2</sup>	<input type="text"/>	点滴			○
4 生理食塩液		250mL	点滴	初回 60分、 2回目以降30分		○
<b>ハーセプチン (初回)</b>	初回4mg/kg、 2回目以降2mg/kg	<input type="text"/>	点滴			○
<b>ハーセプチン (二回目以降)</b>		<input type="text"/>				○
5 生理食塩液		50mL	点滴	15分		○

標準投与量

パクリタキセル

mg

ハーセプチン

初回

mg

2回目以降

mg

※網掛け部分にご記入ください。

1サイクル：7日⇒※(下記参照)

術前後療法サイクル数：原則12回

※何らかの理由により予定された投与が遅れた際には、以下のとおり投与することが望ましい。

- 1) 投与予定日より1週間以内の遅れで投与する際は、2mg/kgを投与する。
- 2) 投与予定日より1週間を越えた後に投与する際は、改めて初回投与量の4mg/kgで投与を行う。なお、次回以降は2mg/kgを1週間間隔で投与する。