

## 癌化学療法 投与計画書

病名: CD20陽性の濾胞性リンパ腫

プロトコール名: **ガザイバ療法(2サイクル目以降)**

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m <sup>2</sup> )
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

クール目

開始日

次回予定日

### 確認事項

□他の癌化学療法と併用する場合はCHOP、COP、トレアキシンのいずれかであること

※0.2又は0.22 μmのフィルターを使用

						DAY
						1
	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	1月0日
1	カロナール錠(200mg)	3錠	内服		ガザイバ投与 30分以上前に内服	○
2	生理食塩液	100mL	点滴	30分		○
	アタラックスP(50mg)	1A	点滴			○
	ソル・メドロール(40mg)	2瓶	点滴			○
3	生理食塩液	210mL	点滴	初回:12.5ml/h(30min)→ 25ml/h(30min)→以降30分毎 に12.5ml/hずつ増量、最大 100ml/hまで可		○
	<b>ガザイバ</b>	1000mg/body	点滴	2回目以降:25ml/h(30min)→ 50ml/h(30min)→以降30分毎 に25ml/hずつ増量、最大100 ml/hまで可		○
4	生理食塩液	50mL	点滴	15分		○

標準投与量

ガザイバ

**1000mg**

※網掛け部分にご記入ください。

**1サイクル** CHOP又はCOPと併用の場合: 21日  
 トレアキシンと併用の場合: 28日  
 維持療法の場合: 単独投与で2ヶ月に1回  
**投与日**: 1サイクル目のみday1, 8, 15  
 2サイクル目以降day1  
 維持療法: day1  
**サイクル数**: CHOPと併用の場合: 8サイクル(CHOPは6サイクル、残り2サイクルはガザイバのみ)  
 COPと併用の場合: 8サイクル  
 トレアキシンと併用の場合: 6サイクル  
 維持療法の場合: 最長2年