

癌化学療法 投与計画書

病名: HER2陽性乳癌

プロトコール名: HP(ハーセプチン+パージェタ)療法

クール目
 開始日
 次回予定日

身長 (cm) 体重 (kg) 体表面積 (m²) 0.00

							DAY 1
	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	1月0日
1	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○
2	生理食塩液		250mL	点滴	初回60分 2回目以降30分		○
	パージェタ (初回)	初回840mg 2回目以降420mg	<input type="text"/>	点滴			○
	パージェタ (二回目以降)		<input type="text"/>				
3	生理食塩液		250mL	点滴	初回 90分、 2回目以降30分		○
	ハーセプチン (初回)	初回8mg/kg、 2回目以降6mg/kg	<input type="text"/>	点滴			○
	ハーセプチン (二回目以降)		<input type="text"/>				
5	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○

標準投与量

パージェタ

初回 **840mg**

2回目以降 **420mg**

ハーセプチン

初回 **mg**

2回目以降 **mg**

※網掛け部分にご記入ください。

1サイクル: 21日⇒※(下記参照)
投与日: day1
サイクル数: 規定なし

※何らかの理由により予定された投与が遅れた際には、以下のとおり投与することが望ましい。

パージェタ

- 1) 前回投与日から6週間未満のときには、420mgを投与する。
- 2) 前回投与日から6週間以上のときには、改めて初回投与量の840mgで投与を行う。なお、次回以降は420mgを3週間間隔で投与する。

ハーセプチン

- 1) 前回投与日から6週間未満のときには、6mg/kgを投与する。
- 2) 前回投与日から6週間以上のときには、改めて初回投与量の8mg/kgで投与を行う。なお、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与する。