

癌化学療法 投与計画書

病名: 非扁平上皮非小細胞肺癌

プロトコール名: **Pembro+CDDP+PEM(導入療法)**

クール目

開始日

次回予定日

身長(cm)

体重(kg)

体表面積(m²)

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

確認事項

- 1週間以上前からバンピタン末 1g/分1を連日服用していること。
- 1週間以上前にフルスミンSの筋注が施行されていること。(以降3コース毎に1回)
- アリムタ投与後からシスプラチンの投与まで必ず30分あける。(ソルデム3輸液の処方があること。)

※0.2~5μmのフィルターを通して投与

| | 薬品名 | プロトコール標準量 | 投与量 | 経路 | 点滴時間・速度 | コメント | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | |
|----|---------------------|----------------------|--------|----|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| | | | | | | | 1月 0日 | 1月 1日 | 1月 2日 | 1月 3日 | |
| 1 | イメドカプセル125mg | | 1Cap | 経口 | | | ○ | / | / | / | |
| | イメドカプセル80mg | | 1Cap | 経口 | | | / | ○ | ○ | | |
| 2 | 生理食塩液 | | 50mL | 点滴 | 15分 | | ○ | / | / | / | 標準投与量 キイトルーダ |
| 3 | 生理食塩液 | | 100mL | 点滴 | 30分 | | ○ | / | / | / | |
| | キイトルーダ | 200mg/body | | 点滴 | | | ○ | / | / | / | 200mg |
| 4 | 生理食塩液 | | 50mL | 点滴 | 5分 | | ○ | / | / | / | アリムタ |
| 5 | アロキシ点滴静注バッグ(0.75mg) | | 1バッグ | 点滴 | 15分 | | ○ | / | / | / | |
| | デキサート(6.6mg) | | 1.5瓶 | 点滴 | | | ○ | / | / | / | |
| 6 | 生理食塩液 | | 100mL | 点滴 | 10分 | | ○ | / | / | / | mg |
| | アリムタ | 500mg/m ² | | 点滴 | | | ○ | / | / | / | |
| 7 | ソルデム3輸液 | | 500mL | 点滴 | 1時間 | | ○ | / | / | / | シスプラチン |
| | 硫酸マグネシウム補正液 20mEq | | 4mEq | | | | ○ | / | / | / | |
| 8 | マンニトール注射液20% | | 150ml | 点滴 | 15分 | | ○ | / | / | / | |
| 9 | 生理食塩液 | | 300mL | 点滴 | 1時間 | | ○ | / | / | / | mg |
| | シスプラチン | 75mg/m ² | | 点滴 | | | ○ | / | / | / | |
| 10 | 生理食塩液 | | 500mL | 点滴 | 1時間 | | ○ | / | / | / | |
| 11 | ソルデム3輸液 | | 500mL | 点滴 | 1時間 | | ○ | / | / | / | |
| | 硫酸マグネシウム補正液 20mEq | | 4mEq | 点滴 | | | ○ | / | / | / | |
| 12 | デカドロン錠(0.5mg) | | 16錠 分2 | 経口 | | day2~day4 | / | ○ | ○ | ○ | |

※網掛け部分にご記入ください。

1サイクル: 21日
投与日: day1
サイクル数: 原則として4コース