

癌化学療法 投与計画書

病名: 乳癌

プロトコール名: **FEC療法**

クール目

開始日

次回予定日

身長(cm) 体重(kg) 体表面積(m²)

--	--	--	--	--

	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4
							1月0日	1月1日	1月2日	1月3日
1	イメドカプセル125mg		1カプセル	経口			○	/	/	/
	イメドカプセル80mg		1カプセル	経口			/	○	○	/
2	生理食塩液		100mL	点滴	15分		○	/	/	/
3	アロキシ点滴静注バッグ(0.75mg)		1バッグ	側管	30分		○	/	/	/
	デキサート(6.6mg)		1.5瓶	側管			○	/	/	/
4	生理食塩液		100mL	側管	15分		○	/	/	/
	エピルピシン	75~100mg/m ²		側管			○	/	/	/
5	生理食塩液		50mL	側管	15分		○	/	/	/
6	生理食塩液		100mL	側管	30分		○	/	/	/
	エンドキサン	500mg/m ²		側管			○	/	/	/
7	生理食塩液		100mL	側管	15分		○	/	/	/
	フルオロウラシル	500mg/m ²		側管			○	/	/	/
8	生理食塩液		50mL	側管	15分		○	/	/	/
9	デカドロン錠(0.5mg)		朝8錠、夕8錠	内服		day2~day4	/	○	○	○

標準投与量

エピルピシン

mg ~ mg

エンドキサン

mg

フルオロウラシル

mg

※網掛け部分にご記入ください。

エピルピシン
総投与量超えないように

mg

1サイクル: 21日
投与日: day1
基本術前後療法サイクル数: 6回 (但しFECの前あるいは後にタキサン剤投与の場合は4回)