

癌化学療法 投与計画書

病名: 膵臓癌

プロトコール名: **アブラキサン+ゲムシタピン療法**

クール目
 開始日
 次回予定日

身長(cm) 体重(kg) 体表面積(m²)

点滴:アブラキサン投与時には、インラインフィルターは使用しないこと。

| | 薬品名 | プロトコール標準量 | 投与量 | 経路 | 点滴時間・速度 | コメント | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | ... | DAY 8 | DAY 9 | DAY 10 | DAY 11 | ... | DAY 15 | DAY 16 | DAY 17 | DAY 18 | |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|----|---------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | | | 1月0日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | | | |
| 1 | アロキシ点滴静注バッグ(0.75mg) | | 1/バッグ | 点滴 | 30分 | | ○ | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
| | デキサート(6.6mg) | | 1瓶 | 点滴 | | | ○ | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
| 2 | 生理食塩液 | | 100mL | 点滴 | 30分 | 生食の投与量は薬剤にて調整 | ○ | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
| | アブラキサン | 125mg/m ² | <input type="text"/> | 点滴 | | | ○ | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
| 3 | 5%ブドウ糖液 | | 100mL | 点滴 | 30分 | | ○ | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
| | ゲムシタピン | 1000 mg/m ² | <input type="text"/> | 点滴 | | | ○ | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
| 4 | 生理食塩液 | | 50mL | 点滴 | 15分 | | ○ | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
| 5 | デカドロン錠(0.5mg) | | 朝4錠、夕4錠 | 内服 | | day1,8,15夕~day4,11,18朝 | ○(夕~) | ○ | ○ | (~朝)○ | ○(夕~) | ○ | ○ | ○ | (~朝)○ | ○(夕~) | ○ | ○ | ○ | (~朝)○ | |

標準投与量

アブラキサン

ゲムシタピン

mg

mg

※網掛け部分にご記入ください。

1サイクル: 28日
投与日: day1, 8, 15