癌化学療法 投与計画書

病名： (結腸癌) ・ 直腸癌

プロトコール名：**アバスチン+XELOX療法**

クール目

開始日

次回予定日

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(㎡)
		0.000

◆オキサリプラチンによる末梢神経障害対策として、前投薬中にカルチコール2A ,マグネシウム硫酸補正液8mLを追加することができる。

	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	ｺﾒﾝﾄ	DAY 1 1月 0日	DAY 2 1月 1日	DAY 3 1月 2日	DAY 4 1月 3日	…	DAY 14 1月 13日	標準投与量
1	ゼローダ	2000mg/m^2/day ★下記参照		経口		**1日2回 朝夕食後 30分以内**	○	○	○	○	○	○	ゼローダ ***2400mg***
2	イメンドカプセル125mg		1カプセル	経口			○						
	イメンドカプセル80mg		1カプセル	経口				○	○				
3	アロキシ点滴静注バッグ(0.75mg)		1バッグ	点滴	30分		○						
	デキサート(6.6mg)		0.5瓶	点滴			○						
4	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○						
5	生理食塩液		100mL	点滴	初回は90分→60分→30分		○						アバスチン
	アバスチン	7.5mg/kg		点滴			○						***mg***
6	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○						
7	5%ブドウ糖注		250mL	点滴	120分		○						オキサリプラチン
	オキサリプラチン	130mg/㎡		点滴			○						***mg***
8	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○						
9	デカドロン錠(0.5mg)		8錠　分2	経口		day1夜～day4朝	○(夜～	○	○	～朝)○			

1サイクル： 21日
投与日： ゼローダ　day1-14
アバスチン、オキサリプラチン　day1

オキサリプラチン
総投与量チェック ***mg***

アバスチンの留意事項
禁忌
・ 喀血がある
避ける方が望ましい
・ 大きな手術の28日以内である
・ 血栓塞栓症の合併がある
・ 蛋白尿2＋以上
・ 消化管穿孔・瘻孔の合併がある

★ゼローダ1回用量

体表面積	
1.36m^{2}未満	1200mg
1.36m^{2}以上1.66m^{2}未満	1500mg
1.66m^{2}以上1.96m^{2}未満	1800mg
1.96m^{2}以上	2100mg