

癌化学療法 投与計画書

病名： 非扁平上皮 非小細胞肺癌

プロトコール名：Pembro+PEM(維持療法)

クール目
 開始日
 次回予定日

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m ²)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

確認事項

- 1週間以上前からパンピタン末 1g/分1を連日服用していること。
- 1週間以上前にフレズミンの筋注が施行されていること。(以降3コース毎に1回)

※0.2~5μmのフィルターを通して投与							DAY 1	
	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・ 速度	コメント	1月0日	
1	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○	標準投与量
2	生理食塩液		100mL	点滴	30分		○	キイトルーダ
	キイトルーダ	200mg/body	<input type="text"/>	点滴			○	200mg
3	生理食塩液		50mL	点滴	5分		○	
4	グラニセトロン点滴静注 バッグ(3mg)		1バッグ	点滴	30分		○	
	デキサート(6.6mg)		1瓶	点滴			○	
5	生理食塩液		100mL	点滴	10分		○	アリムタ
	アリムタ	500mg/m ²	<input type="text"/>	点滴			○	mg
6	生理食塩液		50mL	点滴	10分		○	

※網掛け部分にご記入ください。

1サイクル： 21日
投与日： day1
サイクル数： 導入療法を含めて合計35サイクル