癌化学療法 投与計画書

病名:　結腸癌　・　直腸癌

プロトコール名:**ベクティビックス(Pan)＋FOLFIRI療法(ポート有)**

クール目

開始日

次回予定日

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(㎡)

※ 0.22マイクロ以下のフィルターを通して投与

	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY 1 1月 0日	DAY 2 1月 1日	DAY 3 1月 2日	DAY 4 1月 3日	
1	イメンドカプセル125mg		1カプセル	経口			○				
	イメンドカプセル80mg		1カプセル	経口				○	○		
2	アロキシ点滴静注バッグ(0.75mg)		1バッグ	点滴	15分		○				
	デキサート(6.6mg)		0.5瓶	点滴			○				
3	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○				標準投与量
4	生理食塩液		100mL	点滴	60分(投与量が1000 mgを超える場合は90分)		○				ベクティビックス
	ベクティビックス	6 mg/kg		点滴			○				mg
5	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○				
6	生理食塩液		500mL	側管	120分	7と同時に	○				レボホリナート
	レボホリナート	200mg/㎡		側管			○				mg
7	生理食塩液		500mL	点滴	90分	6と同時に	○				イリノテカン
	イリノテカン	150mg/㎡		点滴			○				mg
8	生理食塩液		100mL	点滴	10分	6終了時に	○				フルオロウラシル
	フルオロウラシル	400mg/㎡		点滴			○				mg
9	生理食塩液		50mL	点滴	15分	8終了時に	○				
10	生理食塩液＋ﾍﾊﾟﾘﾝ2mL		生食の量は薬剤室にて調節	点滴	46時間	9終了時に、2.5ml/hrで	○	○			フルオロウラシル
	フルオロウラシル	2400mg/㎡		点滴		ﾄﾚﾌｭｰｻﾞｰ 2.5mL/hr Infusor Systemに充填	○	○			mg
11	デカドロン錠(0.5mg)		8錠 分2	経口		**day1夜～day4朝**	○(夜～	○	○	～朝)○	

※網掛け部分にご記入ください。

1サイクル: 14日
投与日: ベクティビックス day1
FOLFIRI day1, 2