

癌化学療法 投与計画書 (新規・変更)

カルテ番号

氏 名

生年月日

性別

提出日

主治医:

病名: 乳癌
患者本人へ説明した内容:

手術日

プロトコール名:FEC療法

身長(cm)

体重(kg)

体表面積(m²)

ケール目

開始日

次回予定日

							DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4
							1月 0日	1月 1日	1月 2日	1月 3日
1	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント				
	パロノセトロン点滴静注 バッグ(0.75mg)		1バッグ	点滴	30分		○			
	デキサート(6.6mg)		1.5瓶	点滴			○			
	アロカリス点滴静注 (235mg)		1瓶	点滴			○			
2	生理食塩液		50mL	点滴	5分		○			
3	生理食塩液		100mL	点滴	15分		○			
	エビルピシン	75~100mg/m ²		点滴			○			
4	生理食塩液		50mL	点滴	5分		○			
5	生理食塩液		100mL	点滴	30分		○			
	エンドキサン	500mg/m ²		点滴			○			
6	生理食塩液		100mL	点滴	15分		○			
	フルオロウラシル	500mg/m ²		点滴			○			
7	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○			
8	デカドロン錠(0.5mg)		朝8錠、夕8錠	内服	day2~ day4			○	○	○

標準投与量

エビルピシン

mg

mg

エンドキサン

mg

フルオロウラシル

mg

※網掛け部分にご記入ください。

エビルピシン
総投与量超えないように

mg

1サイクル: 21日

投与日: day1

基本術前後療法サイクル数: 6回(但しFECの前あるいは後にタキサン剤投与の場合は4回)

《注意事項》

- この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
- 計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。