

癌化学療法 投与計画書 (新規・変更)

カルテ番号

氏 名

生年月日

性別

提出日

主治医:

病名: HER2陽性乳癌
患者本人へ説明した内容:

手術日

プロトコール名: フェスゴIN+Eribulin療法

	クール目	身長(cm)	体重(kg)	体表面積 (㎡)
開始日				
次回予定日				

						DAY 1	...	DAY 8
						1月 0日		1月 7日
1	フェスゴ配合皮下注IN	15mL (ベルツズマブ1200mg トラスツズマブ600mg ボルヒアルロニダーゼ アルファ30000U)		皮下注	8分以上かけて	投与後30分間 経過観察	○	
2	生理食塩液		100mL	点滴	30分	○		○
	デキサート(6.6mg)		1瓶	点滴		○		○
3	生理食塩液		50mL	点滴	5分	○		○
	エリブリン	1.4mg/㎡		点滴		○		○
4	生理食塩液		50mL	点滴	15分	○		○

標準投与量

ベルツズマブ
1200mg
トラスツズマブ
600mg

エリブリン

0.mg

※網掛け部分にご記入ください。

1サイクル: 21日※(下記参照)
投与日: フェスゴIN day1
エリブリン day1,8

※何らかの理由により予定された投与が遅れた際には、以下のとおり投与することが望ましい。
※初回投与時および前回フェスゴMA(2回目以降)投与時から6週間以上間隔が空いた場合に適応。

《注意事項》

- 1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
- 2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。
- 3.フェスゴ投与前に、事前に心エコー等で心機能を確認すること
- 4.フェスゴ投与期間中は、定期的に心エコー等で心機能を評価すること

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。