

癌化学療法 投与計画書 (新規・変更)

加算番号

氏 名

生年月日

性別

提出日

主治医:

病名: 結腸癌 ・ 直腸癌
患者本人へ説明した内容:

手術日

プロトコール名: Bev+Cape

クール目

開始日

次回予定日

身長(cm)

体重(kg)

体表面積(m²)

0.000

	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY 1 1月 0日	DAY 2 1月 1日	DAY 3 1月 2日	DAY 4 1月 3日	...	DAY 15 1月 13日	標準投与量 カペシタビン
1	カペシタビン	2000mg/m ² /day ★下記参照		経口		1日2回 朝夕食後 30分以内	○(タ～	○	○	○	○	～朝)○	2400mg
2	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○						
3	生理食塩液		100mL	点滴		初回は 90分→ 60分→ 30分	○						ペバシズマブ
	ペバシズマブ	7.5mg/kg		点滴			○						mg
4	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○						

1サイクル: 21日
投与日: カペシタビン day1ター15朝
ペバシズマブ day1

《注意事項》

- 1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
- 2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。
- ※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。

★カペシタビン1回用量

体表面積 1.36m ² 未満	1200mg
1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1500mg
1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1800mg
1.96m ² 以上	2100mg