

癌化学療法 投与計画書（新規・変更）

カルテ番号

氏 名

生年月日

性別

提出日

主治医:

病名: 結腸癌 直腸癌
患者本人へ説明した内容:

手術日

プロトコル名: Bev+CAPOX療法

クール目

開始日

次回予定日

身長(cm)

体重(kg)

体表面積(m²)

0.000

	薬品名	プロトコル標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY 1 1月 0日	DAY 2 1月 1日	DAY 3 1月 2日	DAY 4 1月 3日	...	DAY 15 1月 13日	標準投与量 カベシタピン
1	カベシタピン	2000mg/m ² /day ★下記参照		経口		1日2回 朝夕食後 30分以内	○(タ～	○	○	○	○	～朝)○	2400mg
2	パロノセトロン点滴静注液1バッグ (0.75mg)		1バッグ	点滴	30分		○						
	デキサート(6.6mg)		0.75瓶	点滴			○						
	アロカリス点滴静注235mg		1瓶	点滴			○						
3	生理食塩液		50mL	点滴	5分		○						
4	生理食塩液		100mL	点滴	初回は 90分→ 60分→ 30分		○						ペバシズマブ
	ペバシズマブ	7.5mg/kg		点滴			○						mg
5	生理食塩液		50mL	点滴	5分		○						
6	5%ブドウ糖注		500mL	点滴	120分		○						オキサリプラチン
	オキサリプラチン	130mg/m ²		点滴			○						mg
7	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○						
8	デキサメタゾン		4mg/日	経口		42.3に内服		○	○				

1サイクル: 21日
投与日: カベシタピン day1タ～15朝
ペバシズマブ、オキサリプラチン day1

オキサリプラチン
総投与量チェック

mg

《注意事項》

- 1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。
※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。

★カベシタピン1回用量

体表面積 1.36m ² 未満	1200mg
1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1500mg
1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1800mg
1.96m ² 以上	2100mg