

癌化学療法 投与計画書 (新規・変更)

カルテ番号

氏 名
生年月日
性別

提出日

主治医:

病名: 結腸癌・直腸癌
患者本人へ説明した内容:

手術日

プロトコール名: Bev+FTD/TPI

ケール目
開始日
次回予定日

身長(cm) 体重(kg) 体表面積(m²)

0.000

	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY 1	DAY 6	DAY 7	DAY 8	DAY 13	DAY 15	標準投与量
							1月 0日	1月 5日	1月 6日	1月 7日	1月 12日	1月 14日	
1	ロンサーフ	トリフルリジンとして 35mg/m ² /回 ★下記参照		経口		1日2回 朝夕食後	○(タ～)	○ ○(～朝)		○(タ～)	○ ○(～朝)		70mg
2	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○					○	ペバシズマブ
3	生理食塩液		100mL	点滴	初回は 90分→ 60分→ 30分		○					○	
	ペバシズマブ	5mg/kg		点滴			○					○	
4	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○					○	

1サイクル: 28日
投与日: ロンサーフ day1タ-6朝, day8タ-13朝
ペバシズマブ day1, 15

★ロンサーフ1回用量

体表面積	1.07m ² 未満	35mg
	1.07m ² 以上1.23m ² 未満	40mg
	1.23m ² 以上1.38m ² 未満	45mg
	1.38m ² 以上1.53m ² 未満	50mg
	1.53m ² 以上1.69m ² 未満	55mg
	1.69m ² 以上1.84m ² 未満	60mg
	1.84m ² 以上1.99m ² 未満	65mg
	1.99m ² 以上2.15m ² 未満	70mg
	2.15m ² 以上	75mg

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。