

癌化学療法 投与計画書（新規・変更）

カルテ番号

氏 名

生年月日

性別

提出日

主治医:

病名: 結腸癌 ・ 直腸癌

患者本人へ説明した内容:

手術日

プロトコル名:Bev+mFOLFOX6療法(ポート有)

開始日

次回予定日

クール目

身長(cm)

体重(kg)

体表面積(m²)

	薬品名	プロトコル標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY 1	DAY 2	DAY 3	
							1月 0日	1月 1日	1月 2日	
1	生食シリンジ10mL		1キット	点滴			○			標準投与量 ペバシズマブ mg
2	パロノセトロン点滴静注液 バッグ(0.75mg)		1バッグ	点滴	30分		○			
	アロカリス点滴静注用235mg		1瓶	点滴			○			
	デキサート(6.6mg)		0.75瓶	点滴			○			
3	生理食塩液		50mL	点滴	5分		○			レボホリナート mg
4	生理食塩液		100mL	点滴	初回は90分 →60分 →30分		○			
	ペバシズマブ	5mg/kg		点滴			○			
5	生理食塩液		50mL	点滴	5分		○			
6	5%ブドウ糖注		250mL	側管	120分	7と同時に	○			オキサリプラチン mg
	レボホリナート	200mg/m ²		側管			○			
7	5%ブドウ糖注		250mL	点滴	120分	6と同時に	○			
	オキサリプラチン	85mg/m ²		点滴			○			
8	5%ブドウ糖注		100mL	点滴	10分	6.7終了時に	○			フルオロウラシル mg
	フルオロウラシル	400mg/m ²		点滴			○			
9	生理食塩液		50mL	点滴	15分	8終了時に	○			
10	生理食塩液		生食の量は 薬剤室にて調節	点滴	46時間	9終了時に	○			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²		点滴		Infusor System に充填	○			フルオロウラシル mg
11	生食シリンジ10mL		1キット	点滴			○			
12	デキサメタゾン		4mg	経口		day2.3		○	○	

1サイクル: 14日
投与日: day1,day2

オキサリプラチン
総投与量チェック

mg

《注意事項》

- 1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。