

癌化学療法 投与計画書 (新規・変更)

カルテ番号

氏 名

生年月日

性別

提出日

主治医:

病名: 結腸癌・直腸癌

手術日

患者本人へ説明した内容:

プロトコール名:mFOLFOX6療法(ポート有)

身長(cm)

体重(kg)

体表面積(m²)

クール目

開始日

次回予定日

	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4	
							1月 0日	1月 1日	1月 2日	1月 3日	
1	生食シリンジ10mL		1キット	静注		ポートフラッシュ	○				標準投与量
2	パロノセトロン点滴静注 バッグ(0.75mg)		1バッグ	点滴	30分		○				
	デキサート(6.6mg)		0.75瓶	点滴			○				
	アロカリス点滴静注235mg		1瓶	点滴			○				
3	生理食塩液		50mL	点滴	5分		○				オキサリプラチン
4	5%ブドウ糖注		250mL	点滴	120分	5と同時に	○				
	オキサリプラチン	85mg/m ²		点滴			○				mg
5	5%ブドウ糖注		250mL	側管	120分	4と同時に	○				レボホリナート
	レボホリナート	200mg/m ²		側管			○				mg
6	5%ブドウ糖注		100mL	点滴	10分	4.5終了時に	○				フルオロウラシル
	フルオロウラシル	400mg/m ²		点滴			○				mg
7	生理食塩液		50mL	点滴	15分	6終了時に	○				フルオロウラシル
8	生理食塩液		生食の量は薬剤室にて調節	点滴	46時間		○				
	フルオロウラシル	2400mg/m ²		点滴		Infusor Systemに充填	○				mg
9	生食シリンジ10mL		1キット	静注		8終了時に	○				
10	デキサメタゾン		4mg/日	経口		day2、3		○	○		

1サイクル: 14日
投与日: day1

オキサリプラチン
総投与量チェック

mg

《注意事項》

- 1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。