

癌化学療法 投与計画書 （新規・変更）

カルテ番号

氏 名

生年月日

性別

提出日

主治医:

病名: 結腸癌・直腸癌

患者本人へ説明した内容:

手術日

プロトコール名:mFOLFOXIRI療法

身長(cm)

体重(kg)

体表面積(m²)

クール目

開始日

次回予定日

	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4	
							1月 0日	1月 1日	1月 2日	1月 3日	
1	生食シリンジ10mL		1キット	点滴			○				標準投与量
2	パロノセトロン点滴静注液バッグ(0.75mg)		1バッグ	点滴			○				
	アロカリス点滴静注235mg		1瓶	点滴	30分		○				
	デキサート(6.6mg)		1.5瓶	点滴			○				
3	生理食塩液		50mL	点滴	5分		○				イリノテカン
4	生理食塩液		500mL	点滴	60分		○				
	イリノテカン	150mg/m ²		点滴			○				mg
5	5%ブドウ糖注		250mL	点滴	120分	6と同時に	○				オキサリプラチン
	オキサリプラチン	85mg/m ²		点滴			○				mg
6	5%ブドウ糖注		250mL	側管	120分	5と同時に	○				レボホリナート
	レボホリナート	200mg/m ²		側管			○				mg
7	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○				フルオロウラシル
8	生理食塩液	生食の量は薬剤室にて調節		点滴	46時間	5.6終了時に	○				
	フルオロウラシル	2400mg/m ²		点滴		Infusor Systemに充填	○				mg
9	生食シリンジ10mL		1キット	点滴			○				
10	デキサメタゾン		8mg/日	経口		day2~day4		○	○	○	

1サイクル: 14日
投与日: day1,day2

オキサリプラチン
総投与量チェック

mg

《注意事項》
1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。