

癌化学療法 投与計画書（新規・変更）

カルチ番号

氏 名

生年月日

性別

提出日

主治医:

病名: CD20陽性のCLL/SLL
患者本人へ説明した内容:

プロトコル名: カルケンス+ガザイバ併用療法 (2サイクル目)

身長(cm)

体重(kg)

体表面積 (m²)

ケール目

.

開始日

次回予定日

確認事項

□1サイクル目はカルケンス内服のみ(200mg分2 day1~28)、2サイクル目からガザイバ併用

※0.2又は0.22 μmのフィルターを使用							DAY 1	DAY 2	...	DAY 8	...	DAY 15	...	DAY 28
	プロトコル標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント		1月 0日	1月 1日		1月 7日		1月 14日		1月 27日
1	カルケンスカプセル 100mg	200mg 分2	内服				○	○	○	○	○	○	○	○
2	カロナール錠(200mg)	3錠	内服		ガザイバ投与 30分以上前に内服		○	○	/	○	/	○	/	/
3	生理食塩液	100mL	点滴	30分			○	○	/	○	/	○	/	/
	アタラックスP(50mg)	1A	点滴				○	○	/	○	/	○	/	/
	ソル・メドロール (40mg)	2瓶	点滴				○	○	/	○	/	○	/	/
4	生理食塩液	96mL	点滴	25ml/h			○	/	/	/	/	/	/	/
	ガザイバ	100mg/body	点滴				○	/	/	/	/	/	/	/
5	生理食塩液	214mL	点滴		13.9ml/h (30min) →27.8ml/h (30min) →以降30分毎に13.9ml/h ずつ増量 最大111.1ml/hまで可 ※		/	○	/	/	/	/	/	/
	ガザイバ	900mg/body	点滴				/	○	/	/	/	/	/	/
6	生理食塩液	210mL	点滴	25ml/h(30min) →50ml/h(30min) →以降30分毎に25ml/h ずつ増量 最大100ml/hまで可 ※			/	/	/	○	/	○	/	/
	ガザイバ	1000mg/body	点滴				/	/	/	○	/	○	/	/
7	生理食塩液	50mL	点滴	15分			○	○	/	○	/	○	/	/

標準投与量
ガザイバ
100mg
900mg
1000mg

※網掛け部分にご記入ください。 ※ガザイバはカルケンス内服から少なくとも1時間以上空けて投与開始

1サイクル: 28日
投与日 カルケンス day1~28
ガザイバ day1,2,8,15

《注意事項》
1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。