

癌化学療法 投与計画書 （新規・変更）

加算番号

氏 名

生年月日

性別

病名:

手術日

患者本人へ説明した内容:

プロトコル名:ピキセオス(寛解導入)療法 第2サイクル

身長(cm) 体重(kg) 体重(kg) 体表面積(m²)

クール目

開始日

次回予定日

- 確認事項
- ☐ 寛解に到達しなかった場合に、第1サイクルの2～5週間後に開始すること

						DAY 1	DAY 2	DAY 3		
	薬品名	プロトコル標準量	投与量	経路	点滴時間・ 速度	コメント	1月 0日	1月 1日	1月 2日	
1	パロノセトロン点滴静注 バッグ(0.75mg)		1バッグ	中心 静脈	30分		○			標準投与量 ピキセオス ユニット
	アロカリス点滴静注 (235mg)		1瓶	中心 静脈			○			
2	生理食塩液		50mL	中心 静脈	5分		○			
3	生理食塩液		50mL	中心 静脈	15分				○	
4	生理食塩液		500mL	中心 静脈	90分		○		○	
	注射用水		20mL	中心 静脈		希釈後4時間以内に投与開始	○		○	ユニット
	ピキセオス	100ユニット/m ²		中心 静脈			○		○	
5	生理食塩液		50mL	中心 静脈	15分		○		○	

1サイクル:14日

投与日: ピキセオス day1,3

ダウノマイシンとして

総投与量超えないように

mg

《注意事項》

1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします

2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。

ピキセオス1ユニットあたりダウノマイシン0.44mg含有