

癌化学療法 投与計画書 （新規・変更）

カルテ番号

氏 名

生年月日

性別

病名:

手術日

患者本人へ説明した内容:

プロトコール名:ビキセオス(地固め)療法

クール目

開始日

次回予定日

身長(cm)

体重(kg)

体重(kg)

体表面積(m²)

確認事項

- ☐ 第1サイクルは寛解導入療法開始から5～8週間後に開始すること
- ☐ 第2サイクルは第1サイクルの地固め療法開始から5～8週間後に開始すること

	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY 1	DAY 2	DAY 3	
							1月 0日	1月 1日	1月 2日	
1	パロノセトロン点滴静注 バッグ(0.75mg)		1バック	点滴	30分		○			標準投与量 ビキセオス
	アロカリス点滴静注 (235mg)		1瓶	点滴	点滴		○			
2	生理食塩液		50mL	点滴	5分		○			
3	生理食塩液		50mL	点滴	15分				○	
3	生理食塩液		500mL	点滴	90分	希釈後4時間以内に投与開始	○		○	ユニット
	注射用水		20mL	点滴			○		○	
	ビキセオス	65ユニット/m ²		点滴			○		○	
4	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○		○	

1サイクル:35日

投与日: ビキセオス day1,3

最大2サイクルまで

ダウノマイシンとして

総投与量超えないように

mg

《注意事項》
1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。
※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。

ビキセオス1ユニットあたりダウノマイシン0.44mg含有