

癌化学療法 投与計画書（新規・変更）

カルテ番号

氏 名

提出日

生年月日

性別

主治医:

病名：未治療のCD30陽性のホジキンリンパ腫
患者本人へ説明した内容：

プロトコール名：A+AVD療法

ケール目

開始日

次回予定日

身長(cm)

体重(kg)

体表面積(m²)

- ◆アドセトリス：最終濃度が0.4～1.2mg/mLになるように調製（生理食塩液の輸液量は下記を参照してください）
- ◆ダカルバジン：点滴バッグからルートまですべて遮光して投与（調製後可及的速やかに投与できるよう調整）
- 血管痛予防のため調製後すぐに投与できるよう、NsからDXR投与開始時にTEL受けてから調製する

							DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4	DAY ...	DAY 15	DAY 16	DAY 17	DAY 18	
	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	1月 0日	1月 1日	1月 2日	1月 3日	...	1月 14日	1月 15日	1月 16日	1月 17日	
1	生理食塩液		500mL	点滴	4時間		○				...	○				標準投与量 アドセトリス
2	パロノセトロン点滴静注バッグ (0.75mg)		1/バッグ	側管	30分		○				...	○				
	アロカリス点滴静注235mg		1瓶	側管			○				...	○				
	デキサート (6.6mg)		1.5瓶	側管			○				...	○				
3	生理食塩液		50mL	側管	5分		○				...	○				ドキシソルピシン
4	生理食塩液	★下記参照	50~100mL	側管	30分	1Vあたり 注射用水10.5mLで溶 解	○				...	○				
	注射用水		0.0 mL	側管		120mg/bodyを 超えないこと (>100kgは100kgとし て計算する)	○				...	○				
	アドセトリス	1.2mg/kg		側管			○				...	○				
5	生理食塩液		50mL	側管	5分		○				...	○				エクザール
6	生理食塩液		100mL	側管	30分		○				...	○				
	ドキシソルピシン	25mg/m ²		側管			○				...	○				mg
7	生理食塩液		50mL	側管	全開で		○				...	○				ダカルバジン
	エクザール	6mg/m ²		側管		10mg/bodyを 超えないこと	○				...	○				
8	生理食塩液		250mL	側管	1時間		○				...	○				mg
	ダカルバジン	375mg/m ²		側管		※溶解・希釈について	○				...	○				
9	生理食塩液		50mL	側管	15分		○				...	○				
10	デキサメタゾン		8mg/日	内服				○	○	○			○	○	○	

※網掛け部分にご記入ください。

ドキシソルピシン
総投与量超えないように

1サイクル：28日

投与日： day1、15

サイクル数：6サイクル

★生理食塩液 輸液量
投与量が44mg未満の場合は生理食塩液50mLで調製

※ダカルバジンの溶解について
添付文書上は注射用水のみだが、抗がん剤調製マニュアルに生食で溶解可の記載あり

《注意事項》
1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。