

癌化学療法 投与計画書（新規・変更）

カルテ番号

氏 名

提出日

生年月日

性別

主治医:

病名: 未治療のCD30陽性のホジキンリンパ腫
患者本人へ説明した内容:

プロトコール名: A+AVd療法

ケール目

開始日

次回予定日

身長(cm)

体重(kg)

体表面積(m²)

- ◆アドセトリス: 最終濃度が0.4～1.2mg/mLになるように調製(生理食塩液の輸液量は下記を参照してください)
- ◆ダカルバジン: 点滴バッグからルートまですべて遮光して投与(調製後可及的速やかに投与できるよう調整)
- 血管痛予防のため調製後すぐに投与できるよう、NsからDXR投与開始時にTEL受けてから調製する

※網掛け部分にご記入ください。

ドキシソルピシン
総投与量超えないように

mg

1サイクル: 28日
投与日: day1、15
サイクル数: 6サイクル

★生理食塩液 輸液量
投与量が44mg未満の場合は生理食塩液50mLで調製

※ダカルバジンの溶解について
添付文書上は注射用水のみだが、抗がん剤調製マニュアルに生食で溶解可の記載あり

《注意事項》
1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。