

癌化学療法 投与計画書 (新規・変更)

カルテ番号

氏 名

生年月日

性別

提出日

主治医:

病名: 再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫

患者本人へ説明した内容:

プロトコル名: Pola+RB療法(2～6サイクル目)

	身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m ²)
クール目			
開始日			
次回予定日			

・RTX90分投与は、2回目以降で、RTX初回投与時に発現した副作用が軽微であり、重篤な心疾患がなく、かつ投与前の末梢血リンパ球数5000/ μ L未満である場合に実施可。

⚠ 薬剤師確認事項 day1(リツキシマブ・ポライビー・ベンダムスチン同日投与)
実施確定後、リツキシマブのみ払い出し。
リツキシマブ終了間近の連絡後、ポライビー調製し払い出し。ポライビー終了間近の連絡後、ベンダムスチン調製し払い出し。
その旨のメモをトレーに貼付すること

※0.2又は0.22 μ のインラインフィルターを使用							DAY 1	DAY 2	
	薬品名	プロトコル標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	1月 0日	1月1日	
1	カロナール錠(200mg)		3錠	経口			○		標準投与量
2	生理食塩液		100mL	点滴	30分		○		
	アタラックスP(50mg)		1A	点滴			○		
	デキサート(6.6mg)		1V	点滴			○		
3	生理食塩液		250mL	点滴			○		リツキシマブ
	リツキシマブBS	375mg/m ²			100mL/hr(30min)→ 200mL/hr(60min) (計90分投与)	総量250mLになるよう調製	○		
4	生理食塩液		50mL	点滴	5分		○		ポライビー
5	生理食塩液		★下記参照	点滴			○		
	注射用水		0mL	点滴	初回90分→ 忍容性が良好であれば2回目以降30分投与可	30mg製剤は1.8mL、 140mg製剤は7.2mLで溶解	○		
	ポライビー	1.8mg/kg		点滴			○		
6	生理食塩液		50mL	点滴	5分		○		ベンダムスチン
7	パロノセトロン点滴静注 バッグ(0.75mg)		1バック	点滴	30分		○		
	アロカリス点滴静注 (235mg)		1V	点滴			○		
8	生理食塩液		50mL	点滴	5分		○		
9	生理食塩液		50mL	点滴	15分			○	
10	生理食塩液		50mL	点滴	10分		○	○	
	ベンダムスチン	90mg/m ²		点滴			○	○	mg
11	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○	○	

※網掛け部分にご記入ください。

★生理食塩液量		
患者体重	45kg未満の場合	50mL
	45kg以上の場合	100mL

1サイクル: 21日
リツキシマブ投与日: day1
ポライビー投与日: day1
ベンダムスチン投与日: day1、2
サイクル数: 5回

《注意事項》
1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。