

癌化学療法 投与計画書（新規・変更）

カルテ番号

氏 名

提出日

生年月日

主治医:

性別

病名:
患者本人へ説明した内容:

プロトコル名: R-CHOP(同日)療法

身長(cm)体重(kg)体表面積(m²)

クール目

開始日

次回予定日

- ・心機能低下症例ではドキソルビンからピノルビン(30-40mg/m2 @ 5%ブドウ糖注100mL)に変更可。
- ・便秘、末梢神経障害が強い症例ではオンコピンをフィルデシン(2.4mg/m2@ 生食50mL)に変更可。
- ・RTX90分投与は、2回目以降で、RTX初回投与時に発現した副作用が軽微であり、重篤な心疾患がなく、かつ投与前の末梢血リンパ球数5000/ μ L未満である場合に実施可。

						DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4	DAY 5		
						1月0日	1月1日	1月2日	1月3日	1月4日		
1	カロナール錠(200mg)		3錠	内服		○					標準投与量 リツキシマブBS	mg
2	生理食塩液		500mL	点滴	6時間	投与時間調節可						
3	生理食塩液		100mL	側管	30分							
	アタラックスP(50mg)		1A	側管								
	ハイドロコートン(100mg)		1瓶	側管							オンコピン	mg
4	生理食塩液		250ml	側管								
	リツキシマブBS	375mg/m ²		側管	100ml/hr(30min)→ 200ml/hr(60min) (計90分投与)	総量250mLに なるよう調製						
5	生理食塩液		50mL	側管	5分							
6	パロノセトロン点滴静注 バッグ(0.75mg)		1バック	側管	30分						ドキソルビン	mg
	水溶性プレドニン	100mg		側管								
	アロカリス点滴静注235mg		1瓶	側管								
7	生理食塩液		50mL	側管	5分							
8	生理食塩液		50mL	側管	全開で						エンドキサン	mg
	オンコピン	1.4mg/m ²		側管		2mg/bodyを 超えないこと						
9	生理食塩液		100mL	側管	30分							
	ドキソルビン	50mg/m ²		側管								
10	生理食塩液		500mL	側管	2時間						エンドキサン	mg
	エンドキサン	750mg/m ²		側管								
11	生理食塩液		50mL	側管	15分							
12	プレドニン錠(5mg)	100mg	朝14錠、昼6錠	内服			○	○	○	○		

※網掛け部分にご記入ください。

1サイクル: 21日
投与日: day1-5
クール数: 計6~8クール

ドキソルビン
総投与量超えないように

mg

- 《注意事項》
- この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
 - 計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。