癌化学療法 投与計画書　（新規・変更）

カルテ番号

氏　名

生年月日

性別

提出日

主治医：

病名：CD20陽性の濾胞性リンパ腫

患者本人へ説明した内容：

プロトコール名：**ガザイバ療法(1サイクル目)**

クール目

開始日

次回予定日

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(㎡)
		.

確認事項

□他の癌化学療法と併用する場合はCHOP、COP、トレアキシンのいずれかであること

※0.2又は0.22μmのフィルターを使用

		プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY 1 1月 0日	…	DAY 8 1月 7日	…	DAY 15 1月 14日	
1	カロナール錠(200mg)		3錠	内服		ガザイバ投与30分以上前に内服	○		○		○	
2	生理食塩液		100mL	点滴	30分		○		○		○	
	アタラックスP(50mg)		1A	点滴			○		○		○	
	ソル・メドロール(40mg)		2瓶	点滴			○		○		○	標準投与量
3	生理食塩液		210mL	点滴			○		○		○	ガザイバ
	ガザイバ	1000mg/body		点滴	初回:12.5ml/h(30min)→25ml/h(30min)→以降30分毎に12.5ml/hずつ増量、最大100ml/hまで可 2回目以降:25ml/h(30min)→50ml/h(30min)→以降30分毎に25ml/hずつ増量、最大100ml/hまで可　※		○		○		○	***1000mg***
4	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○		○		○	

※網掛け部分にご記入ください。

※2サイクル目以降　1サイクル目でGrade3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合25ml/h（30min）→225ml/h　まで増量可

1サイクル　CHOP又はCOPと併用の場合：21日
トレアキシンと併用の場合：28日
維持療法の場合：単独投与で2ヶ月に1回
投与日 1サイクル目のみ：day1,8,15
2サイクル目以降：day1
維持療法：day1
サイクル数：CHOPと併用の場合：8サイクル（CHOPは6サイクル、残り2サイクルはガザイバのみ）
COPと併用の場合：8サイクル
トレアキシンと併用の場合：6サイクル
維持療法の場合：最長2年

《注意事項》
1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。