

癌化学療法 投与計画書 (新規・変更)

加算番号

氏 名

生年月日

性別

提出日

主治医:

病名: CD20陽性の濾胞性リンパ腫
患者本人へ説明した内容:

プロトコール名: ガザイバ+CHOP療法(1サイクル目)

身長(cm)

体重(kg)

体表面積(m²)

クール目

開始日

次回予定日

0.00

- ・心機能低下症例ではドキソルビシンからピノルビン(30~40mg/m² @ 5%ブドウ糖注100mL)に変更可。
- ・便秘、末梢神経障害が強い症例ではオンコピンをフィルデシン(2.4mg/m²@ 生食50mL)に変更可。

		プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY 1 1月 0日	DAY 2 1月 1日	DAY 3 1月 2日	DAY 4 1月 3日	DAY 5 1月 4日	DAY 6 1月 5日	...	DAY 8 1月 7日	...	DAY 15 1月 14日	
1	カロナール錠(200mg)		3錠	内服		ガザイバ投与 30分以上前に内服	○						...	○	...	○	
2	生理食塩液		100mL	点滴	30分		○						...	○	...	○	
	アタラックスP(50mg)		1A	点滴			○						...	○	...	○	
	ソル・メドロール (40mg)		2瓶	点滴			○						...	○	...	○	
3	生理食塩液		210mL	点滴		初回:12.5ml/h(30min)→ 25ml/h(30min)→以降30分毎に 12.5ml/hずつ増量。最大 100ml/hまで可	○						...	○	...	○	標準投与量
	ガザイバ	1000mg/body		点滴		0.2又は0.22μmの フィルターを使用	○						...	○	...	○	ガザイバ 1000mg
4	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○						...	○	...	○	
5	イメドカプセル(125mg)		1カプセル	内服				○					...		...		
6	イメドカプセル(80mg)		1カプセル	内服					○	○			...		...		
7	生理食塩液		500mL	点滴	4時間			○					...		...		
8	パロノセトロン点滴静注パッ ク(0.75mg)		1パック	側管	30分			○					...		...		
	水溶性プレドニン	100mg		側管				○					...		...		
9	生理食塩液		50mL	側管	全開で			○					...		...		オンコピン
	オンコピン	1.4mg/m ²		側管		2mg/bodyを超えないこと		○					...		...		.mg
10	生理食塩液		100mL	側管	30分			○					...		...		ドキソルビシン
	ドキソルビシン	50mg/m ²		側管				○					...		...		mg
11	生理食塩液		500mL	側管	2時間			○					...		...		エンドキサン
	エンドキサン	750mg/m ²		側管				○					...		...		mg
12	生理食塩液		50mL	側管	15分			○					...		...		
13	プレドニン錠	100mg	朝14錠、昼6錠	内服					○	○	○	○	...		...		

1サイクル:21日
投与日:ガザイバ day1、8、15
オンコピン day2
ドキソルビシン day2
エンドキサン day2
サイクル数:8サイクル

※2サイクル目以降 1サイクル目でGrade3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合25ml/h(30min)→225ml/h まで増量可

ドキソルビシン
総投与量超えない
ように

mg

【注意事項】
1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。