癌化学療法 投与計画書　（新規・変更）

カルテ番号
氏　名
生年月日
性別

提出日
主治医：

病名：CD20陽性の濾胞性リンパ腫
患者本人へ説明した内容：

プロトコール名：ガザイバ＋ベンダムスチン療法(1サイクル目)

クール目
開始日
次回予定日

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(㎡)
		0.00

		プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	ｺﾒﾝﾄ	DAY 1	DAY 2	DAY 3	…	DAY 8	…	DAY 15	
							1月 0日	1月 1日	1月 2日		1月 7日		1月 14日	
1	カロナール錠(200mg)		3錠	内服		ガザイバ投与30分以上前に内服	○				○		○	
2	生理食塩液		100mL	点滴	30分		○				○		○	
	アタラックスP(50mg)		1A	点滴			○				○		○	
	ソル・メドロール(40mg)		2瓶	点滴			○				○		○	標準投与量
3	生理食塩液		210mL	点滴	初回:12.5ml/h(30min)→25ml/h(30min)→以降30分毎に12.5ml/hずつ増量、最大100ml/hまで可 2回目以降:25ml/h(30min)→50ml/h(30min)→以降30分毎に25ml/hずつ増量、最大100ml/hまで可 ※	0.2又は0.22μmのフィルターを使用	○				○		○	ガザイバ
	ガザイバ	1000mg/body		点滴			○				○		○	*1000mg*
4	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○		○		○		○	
5	パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg)		1バック	点滴	30分			○						
	アロカリス点滴静注(235mg)		1瓶	点滴				○						
6	生理食塩液		50mL	点滴	5分			○						
7	生理食塩液		50mL	点滴	10分			○	○					ベンダムスチン
	ベンダムスチン	90mg/㎡		点滴				○	○					*mg*
8	生理食塩液		50mL	点滴	15分			○	○					

※網掛け部分にご記入ください。

※2サイクル目以降　1サイクル目でGrade3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合25ml/h（30min）→225ml/h　まで増量可

1サイクル：28日
投与日：ガザイバ　day1、8、15
ベンダムスチン　day2、3
サイクル数：6サイクル
(ガザイバとベンダムスチン初日は同日でも可　⇒その際はガザイバ＋ベンダムスチン(同日)のレジメンを使用すること)

《注意事項》
1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。