

癌化学療法 投与計画書 (新規・変更)

加療番号

氏 名

生年月日

性別

提出日

主治医:

病名: CD20陽性の濾胞性リンパ腫
患者本人へ説明した内容:

プロトコール名: ガザイバ+ベンダムスチン療法(2サイクル目以降)

身長(cm)

体重(kg)

体表面積(m²)

クール目
開始日
次回予定日

						DAY 1	DAY 2	DAY 3			
		プロトコル標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	1月 0日	1月 1日	1月 2日		
1	カロナール錠(200mg)		3錠	内服		ガザイバ投与 30分以上前に内服	○			標準投与量 ガザイバ	
2	生理食塩液		100mL	点滴	30分		○				
	アタラックスP(50mg)		1A	点滴			○				
	ソル・メドロール(40mg)		2瓶	点滴			○				
3	生理食塩液		210mL	点滴	初回:12.5ml/h(30min)→ 25ml/h(30min)→以降30分毎 に12.5ml/hずつ増量、 最大100ml/hまで可 2回目以降:25ml/h(30min)→ 50ml/h(30min)→以降30分毎 に25ml/hずつ増量、 最大100ml/hまで可 ※	0.2又は0.22 μmのフィル ターを使用	○			1000mg	
	ガザイバ	1000mg/body		点滴			○				
4	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○		○		ベンダムスチン mg
5	パロノセトロン点滴静注 バッグ(0.75mg)		1バック	点滴	30分			○			
	アロカリス点滴静注 (235mg)		1瓶	点滴				○			
6	生理食塩液		50mL	点滴	5分			○			
7	生理食塩液		50mL	点滴	10分			○	○	ベンダムスチン mg	
	ベンダムスチン	90mg/m ²						○	○		
8	生理食塩液		50mL	点滴	15分			○	○		

※網掛け部分にご記入ください。

※2サイクル目以降

1サイクル目でGrade3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合25ml/h(30min)→225ml/h まで増量可

1サイクル:28日
投与日:ガザイバ day1
ベンダムスチン day2、3
サイクル数:6サイクル
(ガザイバとベンダムスチン初日は同日でも可 ⇒その際はガザイバ+ベンダムスチン(同日)のレジメンを使用すること)

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。