

癌化学療法 投与計画書 (新規・変更)

カルテ番号

氏 名

生年月日

性別

提出日

主治医:

病名:CD20陽性の濾胞性リンパ腫
患者本人へ説明した内容:

プロトコール名:ガザイバ+ベンダムスチン(同日)療法(2サイクル目以降)

身長(cm)

体重(kg)

体表面積(m²)

開始日

次回予定日

クール目

⚠ 薬剤師確認事項(ガザイバ・ベンダムスチン同日に投与する場合)

実施確認後、ガザイバのみ調製し払い出し。
ガザイバ終了間近の連絡後、ベンダムスチン調製し払い出し。
その旨のメモをトレーに貼付すること

						DAY 1	DAY 2	
	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	1月0日	1月1日	
1	カロナール錠(200mg)	3錠	内服		ガザイバ投与 30分以上前に内服	○		標準投与量 ガザイバ
2	生理食塩液	100mL	点滴	30分		○		
	アタラックスP(50mg)	1A	点滴			○		
	ソル・メドロール(40mg)	2瓶	点滴			○		
3	生理食塩液	210mL	点滴	初回:12.5ml/h(30min)→ 25ml/h(30min)→以降30分毎に 12.5ml/hずつ増量、 最大100ml/hまで可	0.2又は0.22μmの フィルターを使用	○		
	ガザイバ	1000mg/body	点滴	2回目以降:25ml/h(30min)→ 50ml/h(30min)→以降30分毎に 25ml/hずつ増量、 最大100ml/hまで可 ※		○		1000mg
4	生理食塩液	50mL	点滴	5分		○		ベンダムスチン
	生理食塩液	50mL	点滴	15分			○	
5	パロノセトロン点滴静注 バッグ(0.75mg)	1バッグ	点滴	30分		○		
	アロカリス点滴静注 (235mg)	1瓶	点滴			○		
	生理食塩液	50mL	点滴	5分		○		
6	生理食塩液	50mL	点滴	10分		○	○	
	ベンダムスチン	90mg/m ²				○	○	mg
7	生理食塩液	50mL	点滴	15分		○	○	

※網掛け部分にご記入ください。

※2サイクル目以降

1サイクル目でGrade3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合25ml/h(30min)→225ml/h まで増量可

1サイクル:28日
投与日:ガザイバ day1
ベンダムスチン day1、2
サイクル数:6サイクル

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。