

癌化学療法 投与計画書（新規・変更）

加藤番号

氏 名

生年月日

性別

提出

主治医:

病名: 多発性骨髄腫

患者本人へ説明した内容:

プロトコル名: DBLd療法（移植非適応 9サイクル目以降）

ケル目

開始日

次回予定日

身長 (cm)

体重 (kg)

体表面積 (㎡)

確認事項  
□75歳を超える又は過少体重 (BMI: 18.5kg/㎡未満) の患者には、サイクル1～8では、レナデックス錠20mgをday1,4,8,11に投与し (day2,5,9,12省略)  
サイクル9以降は20mg/週を投与することを可とする。

|   | 薬品名              | プロトコル標準量                       | 投与量 | 経路  | 点滴時間・速度   | コメント                          | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | ... | DAY 8 | DAY 9 | DAY 10 | ... | DAY 14 | DAY 15 | ... | DAY 21 | DAY 22 | 標準投与量          |
|---|------------------|--------------------------------|-----|-----|-----------|-------------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|----------------|
|   |                  |                                |     |     |           |                               | 1月 0日 | 1月 1日 | 1月 2日 |     | 1月 7日 | 1月 8日 | 1月 9日  |     | 1月 13日 | 1月 14日 |     | 1月 20日 | 1月 21日 |                |
| 1 | レナリドミドカプセル (5mg) | 25mg/body                      |     | 経口  |           | CrCLが30～59ml/minの患者は10mg/body | ○     | ○     | ○     | ○   | ○     | ○     | ○      | ○   | ○      | ○      | ○   | ○      | ○      |                |
| 2 | レスタミンコフ錠 (10mg)  |                                | 3錠  | 経口  |           | ダラキューロ投与<br>1～3時間前に内服         | ○     |       |       |     |       |       |        |     |        |        |     |        |        |                |
|   | カロナール錠 (200mg)   |                                | 4錠  | 経口  |           |                               | ○     |       |       |     |       |       |        |     |        |        |     |        |        |                |
| 3 | レナデックス錠 (4mg)    | 40mg/body                      | 10錠 | 経口  |           |                               | ○     |       |       |     | ○     |       |        |     |        | ○      |     |        | ○      |                |
| 4 | ダラキューロ           | 15mL/body<br>(ダラツムマブとして1800mg) |     | 皮下注 | 3～5分かけて投与 | 調製後<br>4時間以内に投与               | ○     |       |       |     |       |       |        |     |        |        |     |        |        | ダラキューロ<br>15mL |

1サイクル: 28日  
投与日: ダラキューロ day1  
レナリドミド day1-21

※臨床試験では、Dara→Borの順に投与しているが、メーカー確認したところ、投与順に意味はないとのこと。当院では他レジメンに準じてBor→Daraの順で投与とする。

《注意事項》  
1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします  
2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。