

癌化学療法 投与計画書 (新規・変更)

カルテ番号

氏 名

生年月日

性別

提出日

主治医:

病名: 再発難治性多発性骨髄腫

患者本人へ説明した内容:

プロトコル名:DKd(ダラキューロ)療法(3-6サイクル用)

クール目
開始日
次回予定日

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m ²)

確認事項

- ☐腫瘍量が多い場合は、適宜補液の追加を行う
☐デキサメタゾン(レナデックス)は総投与量40mg/週を投与のため、1日に40mg(レナデックス10錠)内服も可
☐76歳以上、BMI18.5kg/m²未満、コントロール不良の糖尿病又はステロイド療法に忍容性がない、もしくは有害事象を発現した患者に対し、デキサメタゾン20mg/週で投与可

						DAY 1	DAY 2	...	DAY 8	DAY 9	...	DAY 15	DAY 16	...	DAY 21	DAY 22	DAY 23	標準投与量
薬品名	プロトコル標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	1月 0日	1月 1日		1月 7日	1月 8日		1月 14日	1月 15日		1月 21日	1月 22日	1月 23日	
1 レスタミンコープ錠(10mg)		3錠	経口		ダラキューロ投与 1〜3時間前に内服	○						○						
カロナール錠(200mg)		4錠	経口			○						○						
2 レナデックス錠(4mg)	20mg/body	5錠	経口			○	○		○	○		○	○			○	○	
3 5%ブドウ糖液		50mL	点滴	15分		○	○		○	○		○	○					
4 5%ブドウ糖液		70mL	点滴	30分		○	○		○	○		○	○					
注射用水		0mL	点滴		2mg/mLの濃度で溶解 (10mg製剤は5mL、 40mg製剤は20mL)	○	○		○	○		○	○					カイプロリス
カイプロリス点滴静注用	56mg/m ²		点滴			○	○		○	○		○	○					mg
5 5%ブドウ糖液		50mL	点滴	15分		○	○		○	○		○	○					
6 ダラキューロ	15mL/body (ダラツスマブとして1800mg)		皮下注	3〜5分かけて投与	調製後 4時間以内に投与	○						○						ダラキューロ 1,800mg

1サイクル: 28日
投与日: カイプロリス day1,2,8,9,15,16
ダラキューロ day1,15
サイクル数: 3回

《注意事項》
1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。