

癌化学療法 投与計画書 （新規・変更）

診療番号
氏 名
生年月日
性別

提出日
主治医:

病名:再発又は難治性の多発性骨髄腫
患者本人へ説明した内容:

プロトコル名: IsaKd療法(1サイクル目)

クール目
開始日
次回予定日

身長(cm) 体重(kg) 体表面積(m²)

点滴:0.2μm又は0.22μmのフィルターを使用すること						DAY 1	DAY 2	...	DAY 8	DAY 9	...	DAY 15	DAY 16	...	DAY 22	DAY 23
薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	1月 0日	1月 1日		1月 7日	1月 8日		1月 14日	1月 15日		1月 21日	1月 22日
生理食塩液		500mL	点滴	3時間	サークリサ開始15-60分前に投与	○			○			○			○	
レスタミンコーフ錠(10mg)		5錠	経口			○			○			○			○	
カロナール錠(200mg)		5錠	経口			○			○			○			○	
レナデックス錠(4mg)	20mg/body	20 mg	経口			○			○			○			○	
レナデックス錠(4mg)	20mg/body	20 mg	経口				○		○			○				○
生理食塩液		100mL	側管	30分	サークリサ開始15-60分前に投与	○			○			○			○	
ガスター注20mg		1A	側管			○			○			○			○	
生理食塩液		50mL	側管	5分		○			○			○			○	
生理食塩液		250mL	側管	初回:25ml/hr(60min)→ 50ml/hr(30min)→以降30分 毎に25ml/hrずつ増量し 150ml/hrまで可	全量が250mLになるように薬剤室で調節	○			○			○			○	
サークリサ点滴静注	10mg/kg		側管	2回目:50ml/hr(30min)→ 100ml/hr(30min)→以降 200ml/hr 3回目以降:200ml/hr		○			○			○			○	
生理食塩液		50mL	側管	15分											○	
5%ブドウ糖液		50mL	側管	5分		○			○			○				
5%ブドウ糖液		50mL	側管	15分			○		○			○				
5%ブドウ糖液		30mL or 70mL	側管	30分		○	○		○	○		○	○			
注射用水		0mL	側管		2mg/mLの濃度で溶解 (10mg製剤は注射用水5mL、 40mg製剤は注射用水20mL)	○	○		○	○		○	○			
カイプロリス点滴静注用	20mg/m ²		側管		1サイクル目day1,2のみ (輸液:30mL)	○	○									.mg
カイプロリス点滴静注用	56mg/m ²		側管		1サイクル目day8以降 (輸液:70mL)				○	○		○	○			.mg
5%ブドウ糖液		50mL	側管	15分		○	○		○	○		○	○			

※網掛け部分にご記入ください。
※infusion reaction発現時の対応は、添付文書参照。

1サイクル: 28日
投与日:サークリサ day1、8、15、22
カイプロリス day1、2、8、9、15、16
サイクル数:

《注意事項》
1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします。
2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。